



T. C.
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.
Lisans Türü	ÜRETİCİ
Lisans No	4
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	ÇİNKOLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ Çinko Sülfat - Çinko EDTA İçerikli
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	8023
Marka veya Ticari Adı (Varsa)	ÇİNKO-5 FORTE
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.
Gübre Tip İsmi	ÇİNKOLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ Çinko Sülfat - Çinko EDTA İçerikli
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür; Zn:5
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	EDTA ile Şelatlı; Zn:1
Üretildiği Ülke (Türkiye veya İthalat)	Türkiye
Net Ağırlıkları	1.17-5.85-11.7-23.4 kg / 1-5-10-20 lt
Depolama Sıcaklığı	+2 / +20°C
Diğer İşaretler	EC FERTILIZER ibaresi, Çocuklardan uzak tutunuz ibaresi, uyarılar, Parti no, Üretim tar. Son kul. tar. Uygulama şekli, Dozu ve zamanı, Firma adresi
Veriliş Nedeni	Yenileme
Bu belge 07.06.2016 Tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.	

Bu Belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir. Tarih: 07.06.2016


Metin KAYCIOĞLU
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

EC FERTİLİZER

ÇİNKO-5 FORTE

ÇİNKOLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ
(ÇİNKO SÜLFAT-ÇİNKO EDTA İÇERİKLİ)

ÇİNKO-5 FORTE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda çözünür ÇİNKO (Zn)	KÜTLECE (W/W) %
5	5
1	1

(Çinko EDTA çözeltinin stabili olduğu pH aralığı = 5-9)

ÇİNKO-5 FORTE: Yüksek oranda (% 5) çinko içerir. Bitkilerde çinko noksanlığını gidermek ya da çinko noksanlığı oluşumunu erken dönemde engellemek için kullanılması tavsiye edilir. Yüksek pH'lı topraklarda özellikle önerilir.

HAZIRLANIŞI VE UYGULAMA ŞEKLİ: Uygulamadan önce bidon ters-düz edilerek iyice çalkalanmalıdır. Önerilen dozda ÇİNKO-5 FORTE, önce bir miktar su ile bir kovada çözündürülür ve daha sonra depoya aktarılır. Depo, yeterli miktarda su ile doldurulduktan sonra karıştırılır ve uygulamaya geçilir. Her türlü uygulama aleti ve metodu ile topraktan ve toprakları uygulanabilir. **KARŞIYANLIK DURUMU:** Kurvetli alkali (bordo bulamacı) ve asitlik ilaçlarla karışmaz. Yabancı ot ilaçları ile birlikte uygulanabilir. **FİRMA BEYANI:** Gübrenin anormal şartlarda kullanılmasında ve depolanmasında kaynaklardan sorunlardan firmamız sorumlu tutulmaz. Gübrenin sadece teslim sırasında spesifikasyonuna uygunluğu garanti edilir. Özel kullanımlar için mutlaka uzmanlardan tavsiye alınmalıdır. **UYARILAR:** Toprak ve/veya yaprak analizi yapılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Çocuklardan ve gıdalarından uzak tutunuz. Yünlünüzü, tenefüs etmeyiniz. Serimde uygulayınız. Sadece önerilen bülentlerde kullanınız. Diğer bitkiler için Gübretaş'ın uzman mühendislerine danışınız. İlaştıran ve depolarıktan ani darbelerden korununuz. Çok sıcakta ve çok soğukta uzun süre bırakmayınız. 5 kolden fazla üst üste istif etmeyiniz. Tedbir amacıyla, kullanırken eldiven ve gözlük takınız. Deri ve göz ile temasında bölgeyi hemen bol su ile yıkayınız.

Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Asla uygun doz oranlarını aşmayınız.

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN çözeltir (100 litre su ile)	DAMLA SULAMADAN çözeltir (1 ton su ile)
Domates-Biber-Patlıcan-Hıyar	Fide döneminin itibaren	200	400-700
Karviz-Kavun-Kalak			
Çilek			
Bağ-Kivi	Çiçeklenme öncesi gözler yanarken	200	400-700
Muz	Doğum öncesinde	200	400-700
Narenciye			
Kıyaz-Viyane-Saltık-Kayısı-Erik	Çiçeklenme öncesinde	200	400-700
Elma-Annur-Aya			
Zeytin	Çiçeklenme öncesinde	200	400-600
Mısır-Ayçiçeği	Bitki boyunca 15-20 cm otluğa dönmekten itibaren	200	400-700
Patates-S. Pancarı Havuç	Çiçeklenme öncesinde	200	400-700
Bıyıkly-Aspa-Çelikk	Taraktırmadan önce	200	400-700
Pamuk	Karışılma döneminde	200	400-500
Fasulye-Nohut-Mericimek	Geleşme dönemi boyunca	200	400-700
Fındık-Çavz-Anepi Fisiği	Sürgün zamanı	200	400-500
Yapraklı yenen sebzeler (Mant, Kuruçuk, Lahana vb.)	Geleşme dönemi boyunca	200	400-600
Soğan-Sarımsak			
Yeşil zannlar-Sis. Bikkileri			

NOT: Yapraktan uygulama dozunun 10-15 gün ara ile, damla sulama dozunun ise haftalık olarak uygulanır. Yapraktan gübrelenmede besin maddelerinin biki hücrelerine geçişini kolaylaştırmak ve gübrenin etkinliğini artırmak için "yağcı-yapıştıncı" ürünleri kullanılması tavsiye edilir.



6 537 671 38 03 99


Depolama sıcaklığı: +2/+20 °C

Son kullanım tarihi üretin tarihinden itibaren 3 yıl
Üretim ve son kullanım tarihi ile
parti numarası bidon üzerindedir.

Bakanlık Lisans No: 004 • Teslim No: 8023

Net Ağırlık: **1.17 kg** Hacim: **1 L**

GÜBRETAS BİR TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ŞİRKETİDİR



Prayasaya süreceğimiz ürünün etkiyi üzerinde aynı bilgilerim olacağına taahhüt ederiz. Aksinin tespit halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ediyoruz.

Derya Ulusoy Türkiye

Kalite Yöneticisi

27-05-2016

8023