



T.C.
TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü



TESCİL BELGESİ

441 sayılı KHK, 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral, Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik" gereği, aşağıda adı geçen firmanın 01.12.2010 tarihli müracaatı değerlendirilmiş ve yine aşağıda özellikleri verilen ürün tescil edilerek satışa sunulabilir bulunmuştur.

Firmanın

Adı	GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Bakanlık Lisans Türü	ÜRETİCİ
Bakanlık Lisans No	325
Türü	Diğer Ürünler
Tipi	Sıvı Haldeki Hüyük Asit
Verilen Bakanlık Tescil No	4110
Marka veya Ticari Adı (varsa)	HUMAS 22

Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler

Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı	GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Tipi	Sıvı Haldeki Hüyük Asit
Üretildiği Ülke	TÜRKİYE
Toplam Organik Madde %	15
Toplam(Hüyük+Fulvik)Asit %	22
Suda Çözünür K ₂ O %	2
Beyan Edilen Suda Çözünür İz Elementler %	Cu:0,04; Mn:0,1; Zn:0,1
pH	8-10
Ambalaj Tipi	1 Lt(1,1 Kg)-5 Lt(5,5 Kg)-10 Lt(11 Kg)-15 Lt(16,5 Kg)-20 Lt(22 Kg)-25 Lt(27,5 Kg)
Veriliş Nedeni	İlk defa
Diğer İşaretler	Çocuklardan uzak tutunuz ve diğer güvenlik tedbirleri.

İş bu belge verildiği tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

Tarih :31.12.2010


Bahadır BOZKURT
Genel Müdür Yardımcısı

UYGULAMA ŞEKLİ VE HAZIRLANIŞI: HUMAS-22 iyice çalkalanır, önerilen doz ayrı bir kaba alınarak az miktar suda çözülür. Sonra bir miktar su doldurulmuş ilaçlama tankına alınır ve ilaçlama tankı yeterli seviyeye kadar su ile doldurulur, karıştırılarak uygulamaya geçilir.

KARİŞİBİLİRLİK: HUMAS-22 sistemik pestisitler, besleyiciler ve BGD'ler (Bitki Gelişim Düzenleyici) ile karışabilir. Kuvvetli asidik ve kuvvetli bazik preparatlarla karıştırılmamalıdır.

FİRMA BEYANI: Gübrenin anormal şartlarda kullanılması ve depolanmasından kaynaklanan sorunlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Gübrenin sadece teslim sırasında spesifikasyonuna uygunluğu garanti edilir. Özel kullanımlar için mutlaka uzmanlardan tavsiye alınmalıdır.

DİKKAT

Asla uygun doz oranını aşmayınız • Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz • Serinde uygulayınız • Sadece önerilen bitkilerde kullanınız • Diğer bitkiler için Gübretaş'ın uzman mühendislerine danışınız • Taşırken ve depolariken ani darbelerden koruyunuz • Çok sıcakta ve çok soğukta uzun süre bırakmayınız • 5 koliden fazla üst üste istif etmeyiniz • Tedbir amacıyla, kullanırken eldiven ve gözlük takınız • Yutmayınız • Teneffüs etmeyiniz • Deri ve göz ile temasında bölgeyi hemen bol su ile yıkayınız.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	Kütlece (w/w)%
Toplam Organik Madde	15
Toplam Humik + Fulvik Asit	22
Suda çözünür K ₂ O	2
Suda Çözünür BAKIR (Cu)	0.04
Suda Çözünür MANGAN (Mn)	0.1
Suda Çözünür ÇİNKO (Zn)	0.1
pH	8-10

Kasap Sokak No: 22 • 34394 Esentepe - Şişli - İstanbul
Tel: (0212) 376 50 50 • Faks: (0212) 274 00 96 - 274 12 01
e-mail: satis@gubretas.com.tr • web: www.gubretas.com.tr

GÜBRETAŞ BİR TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İŞTİRAKİDİR



DİĞER ÜRÜNLER HUMAS 22 SIVI HALDEKİ HUMİK ASİT

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI ve ÖNERİLEN DOZ	
	TO PRAK TANI (dekar)	YA PRAK TANI (100 litre su/lp)
Misir-Ayçiçeği-Pamuk Hububat-Yerfıstığı Soya-Tütün vb.	Ekim-dikimden önce 1750 cc	Bitki 20-25 cm olunca, çiçeklenme dönemine kadar 1-2 uygulama 75 cc
Domates-Biber Hiyar-Patlıcan Çilek	Ekim-dikimden önce 1500 cc	Bitki 20-25 cm olunca, çiçeklenme dönemine kadar 1-2 uygulama 125 cc
Lahana-Ispanak Kabak-Fasulye-Kereviz Marul-Bezelye	Ekim-dikimden önce 1500 cc	Bitki 15-25 cm olunca, çiçeklenme dönemine kadar 1-2 uygulama 75 cc
Kavun-Karpuz	Ekim-dikimden önce 1750 cc	Bitki 15-25 cm olunca, çiçeklenme dönemine kadar 1-2 uygulama 75 cc
Elma-Armut-Ayva Kayısı-Şeftali-Kiraz Vişne-Erik-Zeytin	İlk baharda ağaçlar uyanıldığında (çiçek açmadan önce) kök diplerine 1500-2000 cc	Meyve bağlama-olgunlaşma dönemi arasında 1-2 uygula- ma 75 cc / ağaç başına
Bağ	İlk baharda çiçek açmadan önce kök diplerine 1750 cc	Meyve bağlama-olgunlaşma dönemi arasında 1-2 uygulama 75 cc
Narenciye	İlk baharda çiçek açmadan önce kök diplerine 1500-2000 cc	Meyve bağlama-olgunlaşma dönemi arasında 1-2 uygula- ma 100 cc / ağaç başına
Şekerpancarı-Patates Soğan-Sarımsak-Havuç	Ekim-dikimden önce 1500 cc	Bitki 15-25 cm olunca, çiçeklenme dönemine kadar 1-2 uygulama 75 cc
Yeşil alanlarda	İlk bahardan itibaren 20-30 gün aralıklarla 100 kg tohumla 1000 cc. 100 kg tohumla 500 cc.	Tophumların ilettilmesinde kullanılan suya ilave edilir.



8 697671 380979

Depolama Sıcaklığı: +2 / +20 C°

Hacim : 1 litre

Net Ağırlık : 1.1 kg

İmal Tarihi :

Son Kull. T. :

Parti No :

Son kullanma tarihi üretim
tarihinden itibaren 3 yıldır.

Bakanlık Lisans No.325

Tescil No:

