



T. C.
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

KİMYEVİ GÜBRE TESCİL BELGESİ

4703 sayılı Kanun, 639 sayılı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri hakkında KHK ve bu kararnameye istinaden yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği, aşağıda adı ve ünvanı yazılı kişi veya kuruluşun başvurusu üzerine aşağıda özellikleri verilen kimyevi gübre tescil edilerek satışa sunulabilir bulunmuştur.

Firmanın	
Adı	GÜBRETAS - GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.
Bakanlık Lisans Türü	ÜRETİCİ
Bakanlık Lisans No	004
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	BORON ETANOL AMİN
Düzenlenirken Esas Alman Kriter	EC FERTILIZER
Verilen Bakanlık Tescil No	5789
Marka veya Ticari Adı (Varsa)	GÜBRETAS BOR-8
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı	GÜBRETAS - GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.
Gübre Tip İsmi	BORON ETANOL AMİN
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür; B:8,0
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	
Üretildiği Ülke	Türkiye
Net Ağırlığı	1,25--6,25-12,5-25 Kg / 1,0-5,0-10-20 Lt
Depolama Sıcaklığı	+2 / +20°C
Veriliş Nedeni	Yenileme
Diğer İşaretler	EC FERTILIZER ibaresi, Çocuklardan uzak tutunuz ibaresi, uyarılar, parti/seri no, lisans no, Tescil No, üretim tar. son kul. tar. uygulama şekli, dozu ve zamanı, firma adresi

İş bu belge verildiği tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

Tarih: 18.01.2015


Nizamettin ŞAHİN
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

GÜBRETAŞ BOR-8

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Suda çözünür BOR (B)

KÜTLECE (M/M) %
8

BOR-8: Yüksek etkili bor kaynağıdır. Yüksek pH'lı topraklar ile yüksek azot ve fosforun içeren topraklarda özellikle kullanılması tavsiye edilir. **HAZIRLANIŞI VE UYGULAMA SEKİ:** Kullanımdan önce bittori her-tiliz ederek iyice çalkalayınız. Önerilen dozda BOR-8 önce bir kova içerisinde bir miktar suda iyice çözünüdürülür, daha sonra depoya aktarılır. Dapo yetileri miktarda su ile dolandırıldıktan sonra karıştırılır ve uygulamaya geçilir. Yapıktan, damla sulamadan ve toprakten, her türlü uygulama alet ve metodu ile verilir. **KARISILIRLIK DURUMU:** Kuvvetli alkali (bordo bulamacı) ve asidik ilaçlarla karışmaz. Yabancı ot ilaçları ile birlikte uygulanabilir. **FİRMA BEYANI:** Gübrenin anormal şartlarda kullanılması ve depolanmasından kaynaklanan sorunlardan firmamız sorumlu tutulmaz. Gübrenin sadece teslim sırasında spesifikasyonuna uygunluğu garanti edilir. Özel kullanımlar için mulatka uzmanlardan tavsiye alınmalıdır. **UYARILAR:** Çocuklardan ve gıdalarla uzak tutunuz. Yutmanız, benfifus etmeyiniz. Önerilen doz oranını aşmayınız. Sadece önerilen bliklerde kullanınız. Diğer blikler için Gübretaş'ın uzman mühendislerine danışınız. Serinde uygulayınız. Tasriken ve depolardan anli darbelerden koruyunuz. Çok sıcakta ve çok soğukta uzun süre bırakmayınız. 5 kolden fazla üst üste istif etmeyiniz. Tedbir amacıyla kullanırken eldiven ve gözük takınız. Deri ve göz ile temasında bölgeyi hemen bol su ile yıkayınız.

Asla uygun doz oranını aşmayınız, sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN ÇÖZÜLÜR (100 litre su başı)	DAMLA SULAMA İÇİN ÇÖZÜLÜR (1 ton su başı)
Domates-Biber	1. uygulama: Fide dikimden sonra 2. uygulama: İlk uygulamadan 15 gün sonra	100	300-500
Pancar-Hıyar	1. uygulama: Fide dikimden sonra 2. uygulama: İlk uygulamadan 15 gün sonra	100	300-500
Çiçek	1. uygulama: Çiçekmeden önce 2. uygulama: İk. uygulamadan 15 gün sonra	100	300-500
Bağ Kivi	1. uygulama: Göz kabarmasında 2. uygulama: Çiçekmeden önce	100	300-500
Aluz	Doğum döneminde	100	300-500
Hararencye	Hasattan sonra çiçeklerden önce	100	400-500
Kıvz-Yiyece Şifalı Karpas-Çiğk	1. uygulama: Çiçekmeden önce 2. uygulama: Hasattan sonra	100	300-500
Elma-Amud-Aya Zeytin	Çiçeklerden önce	100	400-500
Meyir-Ağaçlı	1. uygulama: Ekim öncesi toprakten 2. uygulama: Siki boyundan 15-20 cm ötedeki dönemde	500	300-500
Palaz-S. Pancarı Havuç	1. uygulama: Ekim öncesi toprakten 2. uygulama: Siki boyundan 10-15 cm ötedeki dönemde	500	300-500
Balgun-Ağaç-Çiğk	Karıştırmaya dönünce	100	300-400
Yaprak	Koca oluşturdan sonra	100	300-400
Yaprak Nohut-Heremisk	Geçirne dönemi boyunca	100	300-400
Frank-Çevir-Ahlap-Fasli	Çiçeklerden önce	100	300-500
Yaprak yaprak salatalar Mercul, kereviz, Lahana vs.)	Sarımsakdan sonra çıkıştan 10-15 gün sonra	100	300-500
Sogan-Sarmisak	Bibi boyundan 10-15 cm ötedeki dönemde	100	300-500
Karaba	Khasanota gelişim başlangıcında ik. 10 gün sonra 2. uygulama	75	

NOT: Yapraktan uygulama dozdan 10-15 gün aza ile, damla sulama dozdan ise belirli çıkış günleri boyunca gübreninle beslen meddelerini belli huzerlene geçişin kolaylaşmak ve gübrenin etkinliğini artırmak için "Yaprak-Yeşilçür" ürünlerin kullanılması tavsiye edilir.

Depolanma sıcaklığı: -2/-20 °C
Son kullanma tarihi: Üretim tarihinden itibaren 3 yıl
Uretim ve son kullanma tarihi ile ilgili ayrıntıya baktın derendiniz.
Bakımık İSsmis No: 004 • Teseli No: 5789
8 6597671 380276

Net Ağılık: **1.25 kg**
Hacim: **1 L**

GÜBRETAŞ BİR TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İŞTİRAKİDİR

GÜBRETAŞ BOR-8

EC FERTİLİZER

BORDN ETİFANDLAMIN



Piyasaya süreceğimiz ürünün etiketi üzerinde ayın bilgilerin olacağını taahhüt ederiz. Aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ediyoruz.A.S.

ÜRÜN GELİŞTİRME VE KALİTE MÜDÜRÜ(Y)

ONAYLANMIŞTIR
18.03.2017